

プロトコールマスター内容

発行日時

プロトコール名称 FOLFOX+BV

同一グループ

疾患名 大腸癌	承認区分
診療科 外科	承認日時
投薬日数 1日	承認者
休薬日数 13日	承認取消日時
最大クール数 無制限	承認取消者
心機能の確認 任意	更新者
体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式	
有効開始日	有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT	100IU/L	以上
T-Bil 2mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 3*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999個/mm ³	以下
好中球 1500個/mm ³	以下	血小板	100000個/mm ³	以下

0日前までの検査結果を参照

		day (1)					
注射							
Rp 01		00:00					
点滴注射 1本目 生理食塩液PL「フー」 50mL アロキシ静注0.75mg 5mL デカドロン注射液1.65mg 0.5mL	点滴 15分		1	瓶			
			1	瓶			
			3	管			
Rp 02		00:00					
点滴注射 2本目 テルモ生食 100mL ★アバスタチン	点滴 30分~90分		1	袋			
			5	mg/kg			
Rp 03		00:00					
点滴注射 3本目 Rp3・4は同時に投与 テルモ糖注5% 250mL 全量250mL ★エルプラット	点滴 120分		1	袋			
			85	mg/m ²			
Rp 04		00:00					
側管 (点滴) 4本目 Rp3・4は同時に投与 テルモ糖注5% 250mL ★レボホリナート	点滴側管から div 120分		1	袋			
			200	mg/m ²			
Rp 05		00:00					
側管 (点滴) 5本目 Rp4終了後 生理食塩液PL「フー」 50mL ★5-FU注	点滴側管から div 全開で		1	瓶			
			400	mg/m ²			

続き有り

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時

プロトコール名称 FOLFOX+BV

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分
診療科	外科	承認日時
投薬日数	1日	承認者
休薬日数	13日	承認取消日時
最大クール数	無制限	承認取消者
心機能の確認	任意	更新者
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式	
有効開始日		有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT 100IU/L	以上	
T-Bil 2mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 3*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球 9999個/mm ³	以下	
好中球 1500個/mm ³	以下	血小板 100000個/mm ³	以下	

0 日前までの検査結果を参照

		day (1)						
Rp 06	点滴注射 6本目 10mL/h テルモ生食 500mL 全量460mL ^^ リンパトリカム注N5000単位/5mL「AY」 2mL使用 ★5-FU注	点滴 46時間	1	袋				
Rp 07	点滴注射 7本目 生理食塩液PL「フー」 50mL	フラッシュ用	1	瓶				
-以下余白-								