

# プロトコールマスター内容

発行日時

プロトコール名称 UFT/UZEL(内服)

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m <sup>2</sup> )	計算式 DuBois式		
有効開始日		有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
BUN 9999mg/dL	以上	Scr	1.5mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT	100IU/L	以上
T-Bil 1.5mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 3*10 <sup>3</sup> 個/mm <sup>3</sup>	以下	リンパ球	9999個/mm <sup>3</sup>	以下
好中球 1500個/mm <sup>3</sup>	以下	血小板	100000個/mm <sup>3</sup>	以下

0日前までの検査結果を参照

	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
処方(処方) 院内							
Rp 01 ★ユーエティ配合カプセルT100 0.000m <sup>2</sup> ~ 1.170m <sup>2</sup> 300mg 1.170m <sup>2</sup> ~ 1.500m <sup>2</sup> 400mg 1.500m <sup>2</sup> ~ 1.830m <sup>2</sup> 500mg 1.830m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 600mg .. 1日3回 毎食間 食事の前後1時間は避けて投与	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕
Rp 02 ★ユーゼル錠25mg 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 75mg .. 1日3回 毎食間 食事の前後1時間は避けて投与	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕
続き有り							

# プロトコールマスター内容

発行日時

プロトコール名称 UFT/UZEL (内服)

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m <sup>2</sup> )	計算式 DuBois式		
有効開始日		有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
BUN 9999mg/dL	以上	Scr 1.5mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT 100IU/L	以上	
T-Bil 1.5mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 3*10 <sup>3</sup> 個/mm <sup>3</sup>	以下	リンパ球 9999個/mm <sup>3</sup>	以下	
好中球 1500個/mm <sup>3</sup>	以下	血小板 100000個/mm <sup>3</sup>	以下	

0日前までの検査結果を参照

	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
処方 (処方) 院内							
Rp 01 ★ユーエフィ配合カプセルT100 0.000m <sup>2</sup> ~ 1.170m <sup>2</sup> 300mg 1.170m <sup>2</sup> ~ 1.500m <sup>2</sup> 400mg 1.500m <sup>2</sup> ~ 1.830m <sup>2</sup> 500mg 1.830m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 600mg .. 1日3回 毎食間 食事の前後1時間は避けて投与	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕
Rp 02 ★ユーゼル錠 2.5mg 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 75mg .. 1日3回 毎食間 食事の前後1時間は避けて投与	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕
続き有り							

# プロトコールマスター内容

発行日時

プロトコール名称 UFT/UZEL(内服)

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m <sup>2</sup> )	計算式 DuBois式		
有効開始日		有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
BUN 9999mg/dL	以上	Scr 1.5mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT 100IU/L	以上	
T-Bil 1.5mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 3*10 <sup>3</sup> 個/mm <sup>3</sup>	以下	リンパ球 9999個/mm <sup>3</sup>	以下	
好中球 1500個/mm <sup>3</sup>	以下	血小板 100000個/mm <sup>3</sup>	以下	

0日前までの検査結果を参照

	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
処方 (処方) 院内							
Rp 01 ★ユエフティ配合カプセルT100 0.000m <sup>2</sup> ~ 1.170m <sup>2</sup> 300mg 1.170m <sup>2</sup> ~ 1.500m <sup>2</sup> 400mg 1.500m <sup>2</sup> ~ 1.830m <sup>2</sup> 500mg 1.830m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 600mg .. 1日3回 毎食間 食事の前後1時間は避けて投与	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕
Rp 02 ★ユーゼル錠 2.5mg 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 75mg .. 1日3回 毎食間 食事の前後1時間は避けて投与	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕
続き有り							

# プロトコールマスター内容

発行日時

プロトコール名称 UFT/UZEL (内服)

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m <sup>2</sup> )	計算式 DuBois式		
有効開始日		有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	%

腎機能の検査結果値による警告	有り			
BUN 9999mg/dL	以上	Scr 1.5mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT 100IU/L	以上	
T-Bil 1.5mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 3*10 <sup>3</sup> 個/mm <sup>3</sup>	以下	リンパ球 9999個/mm <sup>3</sup>	以下	
好中球 1500個/mm <sup>3</sup>	以下	血小板 100000個/mm <sup>3</sup>	以下	

0日前までの検査結果を参照

	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
処方 (処方) 院内							
Rp 01 ★ユーエフエイ配合カプセルT100 0.000m <sup>2</sup> ~ 1.170m <sup>2</sup> 300mg 1.170m <sup>2</sup> ~ 1.500m <sup>2</sup> 400mg 1.500m <sup>2</sup> ~ 1.830m <sup>2</sup> 500mg 1.830m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 600mg .. 1日3回 毎食間 食事の前後1時間は避けて投与	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕
Rp 02 ★ユーゼル錠 2.5mg 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 75mg .. 1日3回 毎食間 食事の前後1時間は避けて投与	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕	朝 昼 夕
-以下余白-							