

プロトコールマスター内容

発行日時

プロトコール名称 FOLFIRI+Cmab(初回)

同一グループ

疾患名 大腸癌	承認区分
診療科 外科	承認日時
投薬日数 13日	承認者
休薬日数 1日	承認取消日時
最大クール数 1クール	承認取消者
心機能の確認 任意	更新者
体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式	
有効開始日	有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST IU/L	以上	ALT	IU/L	以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 3*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999 個/mm ³	以下
好中球 9999 個/mm ³	以下	血小板	100000 個/mm ³	以下

0 日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 点滴注射 1本目 生理食塩液 P L「フー」 50 mL アロキシ静注0.75mg 5mL デカドロン注射液1.65mg 0.5mL	00:00						
	点滴 15分						
	1 瓶						
	1 瓶						
	3 管						
Rp 02 点滴注射 2本目 テルモ生食 500 mL 全量500mL ★アービタックス	00:00						
	点滴 120分						
	1 袋						
	400 mg/m ²						
注射							
Rp 04 点滴注射 3本目 生理食塩液 P L「フー」 50 mL	00:00						
	フラッシュ用 アービタックスと同じ速度で						
	1 瓶						
注射							
Rp 05 点滴注射 4本目 Rp5・6は同時に投与 テルモ糖注5% 250 mL ★トポテシン	00:00						
	点滴 90分以上かけて						
	1 袋						
	150 mg/m ²						
Rp 06 側管 (点滴) 5本目 Rp5・6は同時に投与 テルモ糖注5% 250 mL ★レボホリナート	00:00						
	点滴側管から div 120分						
	1 袋						
	200 mg/m ²						
	続き有り						

プロトコールマスター内容

発行日時

プロトコール名称 FOLFIRI+Cmab(初回)

同一グループ

疾患名 大腸癌	承認区分
診療科 外科	承認日時
投薬日数 13日	承認者
休薬日数 1日	承認取消日時
最大クール数 1クール	承認取消者
心機能の確認 任意	更新者
体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式	
有効開始日 2020/ 5/21	有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST IU/L	以上	ALT IU/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 3*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999 個/mm ³ 以下
好中球 9999 個/mm ³	以下	血小板	100000 個/mm ³ 以下

0 日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 07 側管 (点滴) 点滴側管から div 6本目 全開で Rp6終了後 生理食塩液 PL「フー」 50 mL 1 瓶 ★5-FU注 400 mg/m ²	00:00						
Rp 08 点滴注射 点滴 7本目 46時間 10mL/h テルモ生食 500 mL 1 袋 全量460mL 〃 リンナトリウム注N5000単位/5mL「AY」 0.4 A 2mL使用 ★5-FU注 2400 mg/m ²	00:00						
注射 Rp 09 点滴注射 フラッシュ用 8本目 生理食塩液 PL「フー」 50 mL 1 瓶 続き有り			00:00				

プロトコルマスター内容

発行日時

プロトコル名称 FOLFIRI+Cmab(初回)

同一グループ

疾患名 大腸癌 診療科 外科 投薬日数 13日 休薬日数 1日 最大クール数 1クール 心機能の確認 任意 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2020/ 5/21	承認区分 承認日時 承認者 承認取消日時 承認取消者 更新者
有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST IU/L	以上	ALT IU/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 3*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999 個/mm ³	以下
好中球 9999 個/mm ³	以下	血小板	100000 個/mm ³	以下

0 日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)
注射						
Rp 03 点滴注射 点滴 2本目 60分 テルモ生食 250mL 1 袋 全量250mL ★アービタックス 250 mg/m ²	00:00					
Rp 04 点滴注射 フラッシュ用 3本目 アービタックスと同じ速度で 生理食塩液 PL「フー」 50mL 1 瓶 -以下余白-	00:00					