

プロトコルマスター内容

発行日時

プロトコル名称 FOLFOXIRI+BV

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	3日	承認者	
休薬日数	11日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式		
有効開始日	2020/ 5/22	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
BUN 9999mg/dL	以上	Scr 1.2mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT 87IU/L	以上	
T-Bil 1.8mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 3*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球 9999 個/mm ³	以下	
好中球 1500 個/mm ³	以下	血小板 100000 個/mm ³	以下	

0日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)				
注射							
Rp 01	00:00						
点滴注射 1本目 生理食塩液PL「フー」50mL アロキシ静注0.75mg 5mL デカドロン注射液1.65mg 0.5mL	点滴 15分			1 瓶 1 瓶 3 管			
Rp 02	00:00						
点滴注射 2本目 テルモ生食 100mL ★アバステン	点滴 30分~90分			1 袋 5 mg/kg			
Rp 03	00:00						
点滴注射 3本目 テルモ糖注5% 250mL ★トボテシン	点滴 60分			1 袋 150 mg/m ²			
Rp 04	00:00						
点滴注射 4本目 Rp4・5は同時に投与 テルモ糖注5% 250mL 全量250mL ★エルプラット	点滴 120分			1 袋 85 mg/m ²			
Rp 05	00:00						
側管 (点滴) 5本目 Rp4・5は同時に投与 テルモ糖注5% 250mL ★レボホリナート	点滴側管から div 120分			1 袋 200 mg/m ²			
				続き有り			

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時

プロトコール名称 FOLFOXIRI+BV

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	3日	承認者	
休薬日数	11日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式		
有効開始日	2020/ 5/22	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
BUN 9999mg/dL	以上	Scr	1.2mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT	87IU/L	以上
T-Bil 1.8mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 3*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999 個/mm ³	以下
好中球 1500 個/mm ³	以下	血小板	100000 個/mm ³	以下

0 日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)				
Rp 06 点滴注射 6本目 10mL/h テルモ生食 500mL 全量460mL ^^ リンパトリウム注N5000単位/5mL「AY」 2mL使用 ★5-FU注	00:00						
点滴 46時間 1 袋 0.4 A 2400 mg/m ²							
注射							
Rp 07 点滴注射 7本目 生理食塩液 PL「フー」 50mL			00:00				
フラッシュ用 1 瓶 -以下余白-							